

Pilnie potrzebne osocze od ozdrowieńców COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie prosi o oddanie osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Osocze mogą oddać wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

1. przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
2. minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji
3. są w wieku 18-65 lat;
4. spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od dawców krwi (wykaz wymagań i przeciwwskazań do oddawania krwi dostępny na stronie internetowej RCKiK).

Osoby, które otrzymywały w przeszłości przetoczenia krwi lub jej składników a także kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi i oznaczenie przeciwciał do antygenów HLA przed donacją osocza. Badanie można wykonać w Centrum ul. Saska 63/75 i w terenowych oddziałach RCKiK w Warszawie.

Osocze można oddać w RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75

Rejestracja w dni powszednie 7—14, w soboty 7-12

Kontakt tel.: 723 203 207 lub 691 060 504

dostępny poniedziałek – sobota w godzinach 7-14

Skrzynka mailowa : koronawirus@rckik-warszawa.com.pl

Zapraszamy do kontaktu mailowego.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał anty-SARS-CoV-2, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Dawca może oddać osocze trzykrotnie w odstępie 1 tygodnia.

Jeżeli pobranie osocza metodą plazmaferezy będzie utrudnione, ozdrowieniec może oddać krew pełną, z której pozyskamy osocze do leczenia chorych na COVID oraz krwinki czerwone do leczenia innych chorych potrzebujących transfuzji krwi.

Kandydatów na dawców osocza ozdrowieńców prosimy o dostarczenie na wizytę dokumentacji medycznej potwierdzającej przechorowanie COVID-19/zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu RNA-SARS CoV-2 lub testu antygenowego, lub dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS Cov-2, lub skierowanie na izolację).